

Cosa è importante considerare nella stabulazione del vitello?

Gli allevamenti che applicano le migliori pratiche forniscono ambienti al chiuso e all'aperto puliti, confortevoli e dotati di arricchimenti ambientali per supportare lo sviluppo sociale e fisico dei vitelli.

Buona pratica
Migliore pratica

Offrire una varietà di alimenti appetibili ai vitelli svezzati.



Utilizzare attrezzature per l'alimentazione che consentano comportamenti naturali attivi e frequenti, come ad esempio le rastrelliere di paglia.



Garantire un punto di alimentazione per ogni vitello (ad esempio, dispenser multi tettarelle o secchio pop-patoio) per evitare la competizione.



Assicurare il contatto tra il vitello e la madre - o una balia - fino allo svezzamento.



Somministrare una quantità di latte pari almeno al 20% del peso corporeo suddivisa in 4 poppate al giorno.



Fornire un ampio spazio (min. 3m²/vitello) con accesso giornaliero a un'area di esercizio (min. 10m²/vitello).



Offrire ai vitelli l'accesso al pascolo in un luogo asciutto e riparato quando le condizioni meteorologiche lo consentono.



Fornire un ambiente caldo a 12-22°C per i vitelli neonati e a 10-20°C per i vitelli più grandi.



Permettere il contatto vacca-vitello o fornire un sistema di alimentazione che consenta l'espressione di comportamenti naturali evitando il sovraffollamento e la competizione tra vitelli.

Fornire un ambiente caldo e asciutto con ampi spazi e aree designate per l'alimentazione, il riposo, l'esplorazione e il gioco.

Prevedere aree separate per il riposo, l'alimentazione e l'esercizio fisico nei recinti (al chiuso).



Utilizzare lampade a infrarossi o coperte per vitelli in ipotermia (al chiuso).



Creare un'area di riposo confortevole, con pavimento in gomma morbida e un abbondante strato di lettiera di paglia (al chiuso).



Vitelli



Alimentazione



Ambiente



Comportamento



Salute



Allevare i vitelli con la madre o con una balia fino allo svezzamento è importante dal punto di vista comportamentale.



Fornire balle di paglia come arricchimento ambientale e consentire così ai vitelli di nascondersi da conspecifici aggressivi.



Allevare i vitelli con la madre o con la balia, oppure in sistemi di stabulazione in coppia o in gruppo. Utilizzare diversi tipi di arricchimento per favorire un buono sviluppo mentale e fisico dei vitelli.

Creare una zona infermeria dedicata ai vitelli malati e un'area apposita per le procedure e il recupero dei vitelli sani. Utilizzare gabbie di trattamento nei sistemi di contatto vacca-vitello per isolare i vitelli malati. Impiegare elevati standard di biosicurezza per proteggere la salute e il benessere dei vitelli.

Individuare un'area destinata all'infermeria dedicata ai vitelli malati e un'area apposita per la realizzazione di procedure e del recupero dei vitelli sani.



Utilizzare almeno due diversi tipi di arricchimento ambientale per favorire un buono sviluppo mentale e fisico dei vitelli.



Utilizzare la stabulazione in coppia o in gruppo per vitelli (massimo 8) di età, dimensioni e stato di salute simili.



Utilizzare attrezzature, indumenti e stivali puliti e dedicati durante la cura dei vitelli.



Utilizzare gabbie di trattamento nei sistemi di contatto vacca-vitello per isolare i vitelli malati.



Disinfettare i recinti e lasciarli vuoti per 2 settimane prima di riutilizzarli.

