

# Τι είναι σημαντικό για το περιβάλλον του μόσχου;

Οι εκτροφές που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές, παρέχουν καθαρό, άνετο και εμπλουτισμένο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον για την ενίσχυση της κοινωνικής και σωματικής ανάπτυξης των μόσχων.

Ορθή πρακτική  
Βέλτιστη πρακτική

Παράθεση ποικιλίας ευχάριστων ζωοτροφών σε απογαλακτιμένους μόσχους.



Χρήση εξοπλισμού σίτισης που επιτρέπει τη δραστηριότητα και την εκδήλωση συχνών φυσιολογικών συμπεριφορών κατά τη σίτιση, π.χ. ράμπες με άχουρο.



Εξασφάλιση 1 θέσης σίτισης ανά μόσχο (π.χ. διανομέας ή κουβάς με πιπίλες) χωρίς ανταγωνισμό.



Επαφή μόσχου-αγελάδας μέχρι τον απογαλακτισμό, είτε με τη μητέρα του είτε με μια ανάδοχη αγελάδα.



Χορήγηση ποσότητας γάλακτος/υποκατάστατου γάλακτος αντίστοιχης του 20% του σωματικού βάρους σε τουλάχιστον 4 γεύματα/ημέρα.



Παροχή άφθονου χώρου (τουλάχιστον 3m<sup>2</sup>/μόσχο) με καθημερινή πρόσβαση σε χώρο άσκησης (τουλάχιστον 10m<sup>2</sup>/μόσχο).



Πρόσβαση μόσχων σε βοσκότοπο, σε προστατευμένο και ξηρό περιβάλλον όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.



Παροχή ζεστού περιβάλλοντος 12-22°C για τους νεογέννητους μόσχους και 10-20°C για τους μεγαλύτερους μόσχους.



Επαφή μεταξύ αγελάδων και μόσχων ή σύστημα που επιτρέπει τη φυσική συμπεριφορά σίτισης χωρίς ανταγωνισμό από άλλους μόσχους.

Παροχή ενός ζεστού και στεγνού περιβάλλοντος με άφθονο χώρο και καθορισμένους χώρους για τη σίτιση, την ανάπαυση, την εξερεύνηση και το παιχνίδι.

Ξεχωριστές θέσεις ανάπαυσης, σίτισης και άσκησης (σε εσωτερικούς χώρους).



Χρήση λαμπτήρων υπέρυθρης ακτινοβολίας ή καλυμμάτων σώματος για τους μόσχους με υποθερμία (σε εσωτερικούς χώρους).



Δημιουργία άνετου χώρου ανάπαυσης, με μαλακό δάπεδο από καουτσούκ και βαθιά στρωμή αχύρου (σε εσωτερικούς χώρους).



Διατροφή



Περιβάλλον



Συμπεριφορά



Υγεία



Ανάπτυξη μόσχων με τη μητέρα τους ή την ανάδοχη αγελάδα μέχρι τον απογαλακτισμό/ εκδήλωση συμπεριφορών απογαλακτισμού.



Τοποθέτηση δεματίων αχύρου για εμπλουτισμό, που επιτρέπουν στους μόσχους να κρύβονται από άλλους κυρίαρχους μόσχους.



Ανάπτυξη μόσχων με τη μητέρα τους ή την ανάδοχη αγελάδα ή κατά ζεύγη ή ομαδικά. Χρήση διάφορων τύπων εμπλουτισμού για την ενίσχυση της καλής ψυχικής και σωματικής ανάπτυξης των μόσχων.

Δημιουργία ειδικού χώρου νοσηλείας για τους άρρωστους μόσχους και χώρου για τη διενέργεια ιατρικών επεμβάσεων και την αποκατάσταση των υγιών μόσχων. Χρήση ειδικά διαμορφωμένων και φιλικών κελιών σε συστήματα αλληλεπίδρασης αγελάδων - μόσχων για την απομόνωση των άρρωστων μόσχων. Εφαρμογή υψηλών προτύπων βιοασφάλειας για την προστασία της υγείας και της ευζωίας των μόσχων.

Δημιουργία ειδικού χώρου νοσηλείας για τους άρρωστους μόσχους και χώρου για τη διενέργεια ιατρικών επεμβάσεων και την αποκατάσταση των υγιών μόσχων.



Χρήση τουλάχιστον 2 τύπων εμπλουτισμού για την υποστήριξη της καλής πνευματικής και σωματικής ανάπτυξης των μόσχων.



Ομαδικός ή κατά ζεύγη σταβλισμός για μόσχους (μέχρι 8) παρόμοιας ηλικίας, μεγέθους και κατάστασης υγείας.



Χρήση ειδικού καθαρού εξοπλισμού, ρουχισμού και υποδημάτων κατά τη φροντίδα των μόσχων.



Χρήση ειδικά διαμορφωμένων και φιλικών κελιών σε συστήματα αλληλεπίδρασης αγελάδων - μόσχων για την απομόνωση των άρρωστων μόσχων.



Απολύμανση κελιών, τα οποία πρέπει να παραμένουν άδεια για 2 εβδομάδες πριν ξαναχρησιμοποιηθούν.

