

Überwachen Sie das Gewicht und den Body-Condition-Score der einzelnen Kühe wenn die Trächtigkeit bestätigt ist und vor dem Abkalben.



Passen Sie die Ernährung von mageren und fetten Kühen in der letzten Phase der Trächtigkeit an, um Dystokien zu vermeiden.



Füttern Sie Kühe, die kurz vor dem Kalben stehen, mit einem Futter, das dem von Milchkühen ähnelt.



Halten Sie einen abgeordneten sauberen, trockenen und tief eingestreuten Abkalbbereich mit 20 m<sup>2</sup> für jede Kuh (im Stall) vor.



Stellen Sie sicher, dass die Anzahl der Abkalbboxes im Verhältnis zur Anzahl und Intensität der Abkalbungen steht.



In der Abkalbex sollten Geräte/Einrichtungen für das Handling vorhanden sein, sowie Warmwasser und eine Stromversorgung in unmittelbarer Nähe.



Überwachen Sie das Gewicht und den Body-Condition-Score (BCS) der Kuh, wenn die Trächtigkeit bestätigt ist und vor dem Abkalben, um das Fütterungsmanagement und den BCS in der Phase des Kalbens zu optimieren.

Stellen Sie einen separaten Abkalbbereich (20 m<sup>2</sup>/Kuh) mit sauberer, trockener, tiefer Einstreu und sauberen Geräten für das Handling zur Verfügung. Halten Sie die Einstreu sauber und desinfizieren Sie die Buchten nach jeder Belegung. Schützen Sie Kühe, die auf der Weide abkalben, durch die Bereitstellung von Witterungsschutz.

Für das Abkalben auf der Weide: Sorgen Sie dafür, dass sich die Kühe frei bewegen können, und bieten Sie ihnen einen Unterstand zum Schutz vor Kälte und Wind.



Tauschen Sie die Einstreu der Abkalbboxes nach jeder Benutzung aus und desinfizieren Sie die Boxen.



Überwachen Sie Kühe kurz vor dem Abkalben alle 2 Stunden und erhöhen Sie die Häufigkeit, sobald die Wehen regelmäßig einsetzen. Verständigen Sie den Tierarzt, wenn das Kalb 4 Stunden nach dem Abgang des Fruchtwassers noch nicht geboren ist.



Überprüfen Sie die Größe und Position des Kalbes, bevor Sie den Geburtshelfer oder Stricke verwenden, und rufen Sie einen Tierarzt, wenn die Geburt nicht vorangeht.



Rufen Sie den Tierarzt, wenn die Nachgeburt nicht innerhalb von 12 Stunden nach der Geburt des Kalbes abgegangen ist oder Anzeichen von Fieber oder Scheidenausfluss auftreten.



# Kühe



Ernährung



Haltungsumfeld



Verhalten



Gesundheit



Achten Sie auf Anzeichen für das Einsetzen der Wehen, für das Kalben und auf das Verhalten der Kuh nach dem Abkalben; Sensoren und Kameras können dabei unterstützen.



Bringen Sie die Kühe schonend paarweise oder in Gruppen in den Abkalbbereich. Achten Sie auf Anzeichen für das Einsetzen der Wehen, für das Kalben und auf das Verhalten der Kuh nach dem Abkalben; Sensoren und Kameras können dabei unterstützen. Erlauben Sie gesunden Kühen, nach dem Kalben Umgang mit ihrem Kalb.

Bringen Sie die Kühe paarweise oder in Gruppen in den Abkalbbereich, wenn es sich um einen allgemeinen Abkalbbereich handelt.



Erlauben Sie gesunden Kühen, nach dem Abkalben Umgang mit ihrem Kalb.



Machen Sie sich mit den Anzeichen und Phasen des Abkalbens vertraut und greifen Sie nur ein, wenn es unbedingt notwendig ist. Beurteilen Sie die Größe und Position des Kalbes, bevor Sie Stricke oder einen Geburtshelfer einsetzen. Beurteilen Sie den Bedarf an Schmerzmitteln und rufen Sie einen Tierarzt, wenn das Kalben nicht voranschreitet oder die Nachgeburt nicht innerhalb von 12 Stunden nach der Geburt abgegangen ist.

Greifen Sie nur dann in die Abkalbung ein, wenn dies unbedingt erforderlich ist.



Prüfen Sie bei schwierigen Kalbungen den Bedarf an Schmerzmitteln und die Notwendigkeit einen Tierarzt hinzuzuziehen.

