

Οι εκτροφές που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές, επιτυγχάνουν υγιή, φυσιολογικό τοκετό με την επιλογή σπερματοδοτών για μείωση των δυστοκιών, προσεκτική διαχείριση των έγκυων ζώων, παρακολούθηση κατά τον τοκετό, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση όταν απαιτείται και επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μητέρας-νεογέννητου.

Εξατομικευμένη παρακολούθηση του σωματικού βάρους των αγελάδων και του δείκτη θρεπτικής κατάστασης όταν διαγνωσθεί η κωφορία και πριν από τον τοκετό.

Προσαρμογή της διατροφής των αδύνατων και υπέρβαρων αγελάδων στο τελευταίο στάδιο της κωφορίας για την πρόληψη δυστοκιών.

Διατροφή των επίτοκων αγελάδων παρόμοια με εκείνη των αρμεγόμενων αγελάδων.

Ξεχωριστός καθαρός, στεγνός και με βαθιά στρωμένη χώρος τοκετού, με 20m² για κάθε αγελάδα (σε εσωτερικό χώρο).

Διασφάλιση ότι ο αριθμός των χώρων τοκετού είναι ανάλογος με τον αριθμό και την ένταση των τοκετών.

Ενσωμάτωση εξοπλισμών χειρισμού στο χώρο τοκετών, καθώς και ζεστού νερού και παροχής ρεύματος σε κοντινή απόσταση.

Παρακολούθηση του βάρους της αγελάδας και του δείκτη θρεπτικής κατάστασης, όταν διαγνωσθεί η κωφορία και πριν από τον τοκετό, για τη βελτιστοποίηση της διατροφικής διαχείρισης και του δείκτη θρεπτικής κατάστασης κατά τον τοκετό.

Παροχή ξεχωριστού χώρου τοκετού (20m²/αγελάδα) με καθαρή, στεγνή, βαθιά στρωμένη και εξοπλισμό για το χειρισμό. Διατηρείτε την στρωμένη καθαρή και απολυμαίνετε το χώρο μετά από κάθε χρήση. Εξασφαλίστε καταφύγιο στις αγελάδες που γεννούν στην ύπαιθρο.

Για τοκετούς στην ύπαιθρο σε βοσκότοπους: εξασφάλιση ελεύθερης κίνησης αγελάδων και καταφυγίου για προστασία από το κρύο και τους ανέμους.

Αντικατάσταση της στρωμένης και απολύμανση των χώρων τοκετού μετά από κάθε χρήση.

Παρακολούθηση των επίτοκων αγελάδων κάθε 2 ώρες και αύξηση της συχνότητας όταν οι συσπάσεις γίνουν εντονότερες. Κλήση κτηνιάτρου εάν ο μόσχος δεν έχει γεννηθεί 4 ώρες μετά την αποβολή του αμνιακού υγρού.

Αξιολόγηση του μεγέθους και της θέσης του μόσχου, πριν τη χρήση εξοπλισμού έλκυσης και κλήση κτηνιάτρου όταν δε σημειώνεται πρόοδος.

Κτηνιατρική παρέμβαση όταν παρατηρείται κατακράτηση πλακούντα 12 ώρες μετά τον τοκετό ή πυρετός ή εκκρίσεις από το γεννητικό.

Αναγνώριση των συμπτωμάτων του πρώτου σταδίου του τοκετού, του τοκετού και της συμπεριφοράς μετά τον τοκετό-προτείνεται η χρήση αισθητήρων και καμερών παρακολούθησης.

Περιορισμός στρεσογόνων χειρισμών κατά τη μετακίνηση των αγελάδων σε ζεύγη ή ομάδες προς τον χώρο τοκετού. Αναγνώριση των συμπτωμάτων του πρώτου σταδίου του τοκετού, του τοκετού και της συμπεριφοράς μετά τον τοκετό-προτείνεται η χρήση αισθητήρων και καμερών παρακολούθησης. Εξασφάλιση αλληλεπίδρασης υγιών αγελάδων – μόσχων μετά τον τοκετό.

Εξασφάλιση αλληλεπίδρασης υγιών αγελάδων – μόσχων μετά τον τοκετό.

Παρέμβαση στον τοκετό μόνο όταν κρίνεται απολύτως απαραίτητο.

Αξιολόγηση ανάγκης αναληψίας και επικοινωνία με τον κτηνίατρο σε περιπτώσεις δυστοκίας.

Μετακίνηση των αγελάδων σε ζεύγη ή ομάδες προς τον χώρο τοκετού.

Εξασφάλιση αλληλεπίδρασης υγιών αγελάδων – μόσχων μετά τον τοκετό.

Παρέμβαση στον τοκετό μόνο όταν κρίνεται απολύτως απαραίτητο.

Αξιολόγηση ανάγκης αναληψίας και επικοινωνία με τον κτηνίατρο σε περιπτώσεις δυστοκίας.

Αγελάδες

